

Les guides de bonne pratiques toujours adaptés à la MG ?



à propos de la maladie d'Alzheimer

Les syndromes démentiels

Maladie d'Alzheimer

Démences vasculaires

Démences frontotemporales

Démence à corps de Lewy

Berr C, Nassime TN, Nourashemi F, Andrieu S. Epidémiologie des démences. Presse Med 2007;36:1431-41.

Diagnostiquer la maladie d'Alzheimer ?



HAS. Diagnostic et prise en charge de la maladie d'Alzheimer et des maladies apparentées. Argumentaire. Mars 2008.

Alzheimer ; Plan 2008-2012. Sur : <http://www.plan-alzheimer.gouv.fr/>



4ÈME JOURNÉE UNIVERSITAIRE
DE MÉDECINE GÉNÉRALE D'Auvergne

Quelles recommandations ?

Diagnostic précoce

→ tests
neuropsychologiques

Consultation « spécialisée » de mémoire

→ imagerie

→ biomarqueurs

Prescription médicaments « spécifiques »



13 références biblio



Guides de pratique clinique



Mise au point de neurologues et gériatres



un rapport sénatorial

Aucune référence bibliographique en soins primaires / MG

niveau de preuve ?

Annoncer la maladie d'Alzheimer¹ ?



Recommandation de bonne pratique Maladie d'Alzheimer et maladies apparentées :
annonce et accompagnement du diagnostic. Septembre 2009

Annoncer la maladie d'Alzheimer¹ ?

Le médecin « spécialiste » établit et annonce le diagnostic

Le patient est informé le premier de son diagnostic

Le médecin traitant est informé

L'annonce s'accompagne d'un plan de soins et d'aide

26 références biblio

4 concernent la MG



2 étude qualitative hollandaise et américaine ^{1,2}



1 étude prospective hollandaise 2006 ³



1 enquête par questionnaire 631 MG français de réseau sentinelles

Niveau de preuve : faible / avis d'experts

1. van Hout H et al. General practitioners on dementia tasks, practices and obstacles. *Patient Educ Couns* 2000;39:219-25.

2. Connell CM et al. Attitudes toward the diagnosis and disclosure of dementia among family caregivers and primary care physicians. *Gerontologist* 2004;44(4):500-7.

3. van Hout HP et al. Do general practitioners disclose correct information to their patients suspected of dementia and their caregivers? A prospective observational study. *Aging Ment Health* 2006;10(2):151-5.

4. Cantegreil-Kallen I *et al.* Disclosure of diagnosis of Alzheimer's disease in French general practice. *Am J Alzheimers Dis Rel Demen* 2005;20:220-7.



2 recommandations professionnelles non adaptées à la pratique du MG



Garder
un œil
critique !

En évidence :



Absence de recherche en soins primaires


Nécessité d'une recherche en soins primaires

Des études de cohortes
longitudinales

→ Décrire les caractéristiques des patients suivis en MG.
→ Facteurs prédictifs d'hospitalisation, de chute, d'institutionnalisation, ...

Des Étude d'intervention
et des essais
comparatifs randomisés

→ Effet du diagnostic dans la mise en place d'un accompagnement psychosocial.
→ Impact d'une consultation dédiée à l'aidant sur sa qualité de vie.
→ Intérêt de l'accueil de jour pour les patients et l'aidant





Des recherches axées
sur les stratégies
diagnostiques et la
démarche décisionnelle

Des études évaluant
l'efficacité et l'efficience
des soins quotidiens

→ La gestion de la plainte
mnésique en MG.
→ L'annonce du diagnostic par le
MG.
→ Evaluation des soutiens
psycho-sociaux mis en place par
les MG.

→ Suivi nutritionnel et maintien à
domicile
→ Evaluer un protocole
d'optimisation de coopération entre
MG et les infirmières.





Recherche utilisée par
Les recommandations

Médecin généraliste

Recherche
en médecine
générale



Merci de votre attention