

Les médias font-ils douter les patients des prescriptions de leur médecin généraliste ?

Dr Clément NAFFRECHOUX, Dr Benoit CAMBON

Contexte

- Bruit médiatique important des effets indésirables des médicaments
 - Affaire médiateur depuis 2009
 - Pilules 3^{ème} génération
 - Statines
 - Vaccins Gardasil, Hépatite B...
 - Générique du furosémide
- Climat de méfiance entretenu par les médias omniprésents dans notre société (journaux, internet, TV...)



Objectif principal



Montrer qu'entendre dans les médias une information concernant leur traitement fait douter les patients de la prescription de leur médecin généraliste

Objectifs secondaires


- Identifier une sous-population doutant plus de la prescription de leur MG
- Identifier une sous-population arrêtant le traitement d'elle même



Méthode

- Etude analytique transversale participative par questionnaires
- 20 cabinets de MG du Puy de Dome randomisés, 19 inclus
- 100 questionnaires / salle d'attente
- du 10 au 15 février 2014

- Statistiques :
 - test Khi2 pour les variables qualitatives,
 - test de Student pour les variables quantitatives



Questionnaire

- Données sociodémographique
 - Médias consultés
 - Traitement chronique ou non
 - Fréquence consultation
 - MT déclaré...
- Critère de jugement principal = Force d'association entre :



X - Avez-vous déjà douté de la prescription de votre médecin sur votre traitement chronique ou votre vaccination ?

- Oui
- Non

XI - Avez-vous déjà eu connaissance dans les médias d'une information concernant un de vos traitements chronique ou vaccin ?

- Oui
- Non

Caractéristiques démographiques de la population

| Classe | Pourcentage (n=571) |
|----------------------------|---------------------|
| SEXE | |
| Femme | 68 % |
| Homme | 32 % |
| AGE | |
| < 25 ans | 8,76 % |
| 26 - 45 ans | 28,02 % |
| 46 - 65 ans | 37,48 % |
| > 65 ans | 25,74 % |
| MILIEU GEOGRAPHIQUE | |
| Rural | 25 % |
| Semi-rural | 42 % |
| Urbain | 32 % |

Résultat principal

| | | Info dans les médias | | Total |
|--------------------------|-----|----------------------|-------------|-------------|
| | | NON | OUI | |
| Doute de la prescription | NON | 296 (51,8%) | 162 (28,4%) | 458 (80,2%) |
| | OUI | 15 (2,6%) | 98 (17,2%) | 113 (19,8%) |
| Total | | 311 (54,5%) | 260 (45,5%) | 571 (100%) |

Les patients qui entendent une information concernant leur traitement dans les médias doutent plus de la prescription ($p < 0,01$)

OR = 11,9 (IC[6,6-22,8])

A noter : 49% des patients qui doutent déclarent perdre confiance dans leurs MG

Caractéristique de la population qui doute : Analyse univariée

6 caractéristiques ressortent comme favorisant le doute

| Caractéristique démographique | % dans la population doutant (n = 113) | % dans la population ne doutant pas (n= 458) | p |
|-------------------------------|--|---|-------|
| Lecture de Journaux | 70 % | 54 % | 0,002 |
| Lecture d'Internet | 67 % | 56 % | 0,031 |
| Cadres | 13,2 % | 7 % | 0,003 |
| Niveau d'étude | 39 % des études sup vs 5,3 % sans diplôme | 27 % études supérieures vs 12,4 % sans diplôme | 0,003 |
| Nombre de médias utilisés | 31 % en utilisent 5 contre 5% un seul | 19 % en utilisent 5 contre 16% un seul | 0,001 |
| Traitement chronique | 86 % | 75 % | 0,003 |

Population arrêtant leur traitement

- Les patients n'ayant pas déclarés de MT arrêtent plus les traitements sans en parler au MG
 - Patients qui arrêtent leur traitement : 20% n'ont pas déclaré de médecin traitant
 - Patients qui continuent leur traitement : 2% n'ont pas déclaré de médecin traitant
 - $p=0,004$



Conclusion

- Les informations médicales dans les médias
→ patient doutent de la prescription de leur MG
- Patients doutant plus :
 - Haut niveau d'étude
 - Lecteurs de journaux
- Les patients sans médecin traitant arrêtent plus les traitements d'eux même

PREVENTION : en parler aux patients
lorsqu'une info passe dans les médias



MERCI DE VOTRE PRESENCE ET DE VOTRE ATTENTION

**Il m'arrive de
tellement douter
de tout que je ne
suis pas toujours
certain d'être sûr
de douter.**

